

Návod pro PsyEhno Easy Kit a Mushbag

0) Sterilizace injekce se spory

Dejte injekci se spory na 72h do mrazáku (-18°C) poté injekci vyndejte a nechte rozmrznout (zvyšuje to úspěšnost).

1) Umyjte si ruce

Než začnete pracovat vždy si pečlivě umyjte ruce (hlavně u bodu č.6).



2) Vyčistěte místo vpichu

Alkoholem nasáklým tamponem dezinfikujte místo vpichu. Poté už se místa nedotýkejte.



3) Zahřejte jehlu nad plamenem

Po dobu 5-10s dobře protřepte jehlu se spory. Poté zahřejte (opalte) jehlu dokud nezčervená a nechte 15-20s ochladit.



4) Naočkujte

Opatrně vpíchněte jehlu do Mushbagu a vytlačte obsah stříkačky. Raději v místě kde není žito, na sáčku výš tak aby jehla mířila směrem k žitu. Poté místo vpichu zalepte alkoholem nasáklým tamponem. Opatrně promněte pytel, aby se spory rozšířily.



5) Inkubujte

Uskladněte do teplého (kolem 28 °C) a tmavého místa (nejlepší je neprůhledný box). Nižší teploty zpomalují proces inkubace. Můžete použít teplé destičky, topítka do akvárií atd., ale nikdy na ně nepokládejte Mushbag, může dojít k vysušení. Pokud se Mushbag kontaminuje nelze ho zachránit.



6) Přesazování

Poté co žito proroste myceliem se přesadí do připravené nádoby. Na dno uděláte vrstvu z perlitu na ní vrstvu žita a navrch vrstva vermikulitu. Nádobu uzavřete a naplníte vodou (převařenou, teplota kolem 20 °C) necháte pár minut odstát a všechnu přebytečnou vodu vylejete. Misku umístěte na teplé (kolem 24-26 °C) a světlé místo.



7) Růst

Dále až mycelium proroste v misce vrstvu vermikulitu tak sundejte víko. Misku umístěte do sáčku s filtrem. A dejte zpět na teplé (kolem 24-26 °C) a světlé místo.



Upozornění: Tento produkt neobsahuje žádné psychoaktivní či zakázané látky. Je prodáván výhradně pro výzkum, etnobotanické a sběratelské účely. Pěstováním se dostáváte do rozporu s legislativou ČR. Konzumace vzrostlých plodnic se nedoporučuje. Veškeré uvedené texty mají pouze informativní charakter a slouží k obecně popisným a vzdělávacím potřebám.